

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



LA TRANSCRIPTION

PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARNp

2-le promoteur

3-l'élongation

4-la terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES PROCARYOTES

1-l' ARNp

2-le promoteur

3-l'élongation

4-la terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

GENERALITES

- SYNTHÈSE ENZYMATIQUE DE **TOUS LES ARNS** A PARTIR D'UN ADN MATRICE.
- PREMIÈRE PHASE DU PROCESSUS DE L'EXPRESSION DES GENES.
- CATALYSEE PAR UNE ARN polymérase avec comme matière première: LES NTP et du magnésium.
- SE FAIT DANS LE SENS $5' \rightarrow 3'$.
- L'ADN matrice: BRIN ANTISENS et l'ADN complémentaire :BRIN SENS.

PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES PROCARYOTES

1-l' ARNp

2-le promoteur

3-l'élongation

4-la terminaison


PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

► Elle se déroule en 3 étapes:

INITIATION ELONGATION TERMINAISON



PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARNp

2-le promoteur

3-l'élongation

4-la terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

initiation

-Fixation d'une ARNpoly(enzyme à plusieurs s/unités) à l'ADN double brin au niveau du PROMOTEUR.


PROMOTEUR: séquences d'ADN situées en amont du gène à transcrire.

C'est à son niveau que se déroule et s'ouvre localement la double hélice → BULLE DE TRANSCRIPTION.

-démarrage de la synthèse à partir du SITE DE DEPART (site d'initiation: défini comme la position +1 de la séquence du gène).

L'ARNpoly et ses co-facteurs rassemblés:
COMPLEXE DE TRANSCRIPTION

initiation



PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARNp

2-le promoteur

3-l'élongation


4-la terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

élongation

- l'ARN poly ajoute des ribonucléotides de manière covalente à l'extrémité 3' de la chaîne croissante d'ARN.
- La synthèse se fait dans le sens 5'→3' sur l'ADN matrice (3'→5').
- Morphologiquement: déplacement de la BULLE DE TRANSCRIPTION dans le sens 5'→3'



PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARNp

2-le promoteur

3-l'élongation


4-la terminaison


PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

terminaison

- la fin de la synthèse et la dissociation du COMPLEXE DE TRANSCRIPTION se fait au niveau du TERMINATEUR.
- Cette région pousse la polymérase à marquer un temps d'arrêt et cesser la transcription.





PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARN polymerase

2-le promoteur

3-l'élongation

4-la terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

1- L'ARN POLYMERASE

UNE SEULE ARN_p EST RESPONSABLE DE LA TRANSCRIPTION DE TOUS LES ARNS.

LA PLUS ETUDIEE EST CELLE D'E.Coli:
ELLE EST CONSTITUEE DE 5 SOUS UNITES:

$2\alpha \beta \beta' \sigma$

L'ARN polymérase procaryote

$$2\alpha \beta \beta' \sigma$$

Les s/unités α : se lient aux régions régulatrices.

La s/unité β : forme les liaisons phosphodiester.

La s/unité β' : se lie à l'ADN matriciel.

La s/unité σ : reconnaît le promoteur et initie la synthèse (participe à la fixation de l'ARNpoly au niveau du promoteur).

$2\alpha \beta \beta' \sigma$ est appelée holoenzyme: noyau+facteur σ .

Le facteur σ est essentiel à l'initiation, il est libéré lors de l'élongation.

PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARN polymerase

2-le promoteur

3-l'élongation

4-la terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES


TDD: synthèse du pré ARNm


2-Le promoteur

Deux séquences consensus:

→ motif TTGACA (fixation de σ)

→ motif TATAAT (ouverture de la double hélice).





PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARN polymerase

2-le promoteur

3-l'élongation

4-la terminaison


PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

3-L' élongation

La chaine d'ARN commence par 3 phosphates associés à une base purique (soit adénine soit guanine) PPPG ou PPPA.

Le facteur σ est libéré, l'élongation se poursuit jusqu'au TERMINATEUR



PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARN polymerase

2-le promoteur

3-l'élongation


4-la terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

4-La terminaison

- Formation d'une structure en épingle à cheveux → provoque le ralentissement et l'arrêt de l'ARNpoly
- Deux types de sites sont décrits:
 - terminaisons intrinsèques: ne font intervenir aucun facteur supplémentaire.
 - terminaison Rho-dépendants: La prot Rho est indispensable pour assurer la terminaison et libérer le transcrit.



PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARN polymerase

2-le promoteur

3-l'élongation

4-la terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES EUCARYOTES

- même mécanisme que chez les procaryotes.
- les différences portent sur:
 - la complexité de l'initiation(intervention de plusieurs facteurs de transcription avec l'ARNp).
 - l'absence d'une terminaison aussi bien défini.
 - la présence de 3 ARNpoly:

ARNp I

ARNp II

ARNpIII

Les différents ARNp eucaryotes

Enzyme	ARNp I	ARNp II	ARNp III
Structure	NOMBREUSES SOUS UNITES DE 8 A 14		
ARN codés	ARNr :28S,18S,5.8S	ARNprémessagers	ARNr 5S, ARNt, les autres petits ARN
Facteurs de transcription	Oui au moins 2	Oui au moins 6	Oui au moins 2 ou 3
Initiation: -reconnaissance du promoteur. -fixation de l'ARNp	UBF ₁ SL ₁	TFII D TFII D	TFIIIA+TFIIIC(ARN t et ARNr5S) TFIIIB
élongation	//	Libération de tous les facteurs sauf TFII H	Intervention de plusieurs facteurs de transcriptions pour permettre la libération de l'ARNp du promoteur
terminaison	Facteurs de terminaison	Clivage au niveau du transcrit	Signal de terminaison

PLAN

GENERALITES

MECANISME GENERAL DE LA TRANSCRIPTION

initiation

élongation

terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
PROCARYOTES

1-l' ARN polymerase

2-le promoteur

3-l'élongation

4-la terminaison

PARTICULARITES DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES
EUCARYOTES

TDD: synthèse du pré ARNm

TYPE DE DESCRIPTION

SYNTHESE DU PRE ARNm

1- initiation:

Le promoteur est une séquence consensus:

La boîte TATA(TATA box) située à -25

On peut trouver deux autres séquences:

CAAT box (-40)

GC box (-110)

L'action de l'ARNpII nécessite l'action des facteurs de transcription TF II surtout TF II D qui est nécessaire pour l'initiation puis :TF II A, TF II B, TF II F, TF II E, TF II H, TF II J

2- Elongation:

Ajout des nucléotides ATP, GTP, UTP, CTP.

Une chaîne d'ARN se forme et s'allonge dans le sens $5' \rightarrow 3'$.

3- Terminaison:

Le transcrit formé est clivé en un point précis, une vingtaine de bases en aval d'un site AAUAAA appelé SIGNAL DE CLIVAGE.

La Poly A polymérase ajoute immédiatement 100 à 250 adénines, selon l'organisme considéré, à l'extrémité $3'$